НАРЕШТІ!

ТіараТріо®

УВАГА!

ПЕРША В УКРАЇНІ
3-компонентна генерична комбінація
ВАЛСАРТАНУ АМЛОДИПІНУ ГІДРОХЛОРТІАЗИДУ[1,2,3,4]

ПОТРІЙНА СИЛА[4]
ДЛЯ ПОКРАЩЕНОГО КОНТРОЛЮ АТ

ПОТРІЙНИЙ ЗАХИСТ[4]
ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ

▶ За українською ціною[4]

▶ Від фармацевтичної компанії «Дарниця»

[1]Перша генерична 3-компонентна комбінація, що містить валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид, зареєстрована в Україні.
[2]За даними Державного реєстру лікарських засобів МОЗ України про зареєстровані препарати станом на 06.06.2016 р. (http://www.drlz.kiev.ua).
[3]Дані надані ТОВ «Проксіма Рісерч» №363 від 13 травня 2016 р.
[4]http://www.apteka.ua/article/371624

Тіара Тріо®. Р.п. № UA/15069/01/01, № UA/15070/01/01 від 06.04.2016 р. **Склад**. 1 таблетка по 5 мг/12,5 мг/160 мг містить: амлодипіну бесилат у перерахуванні на амлодипін 5 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг, валсартан 160 мг; 1 таблетка по 10 мг/12,5 мг/160 мг містить: амлодипіну бесилат у перерахуванні на амлодипін 10 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг, валсартан 160 мг. **Лікарська форма**. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. **Фармакотерапевтична група**. Антагоністи ангіотензину II, інші комбінації. **Код АТХ**. C09D X01. **Показання**. Лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів з артеріальним тиском, адекватно контрольованим комбінацією амлодипіну, валсартану і гідрохлортіазиду, які застосовують у вигляді трьох окремих препаратів або у вигляді двох препаратів, один з яких є комбінованим. **Протипоказання**. Гіперчутливість до діючих речовин, інших сульфонамідів, похідних дигідропіридину або до будь-якої допоміжної речовини. Протипоказано вагітним та жінкам, які планують завагітніти. Порушення функції печінки, біліарний цироз або холестаз. Тяжкі порушення функції нирок, анурія, перебування на діалізі. Супутнє застосування антагоністів рецепторів ангіотензину, включаючи валсартан, або інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту з аліскіреном пацієнтам із цукровим діабетом або з порушенням функції нирок. Рефрактерна гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіперкальціємія, симптоматична гіперурикемія. Тяжка гіпотензія. Шок, включаючи кардіогенний. Обструкція вивідного тракту лівого шлуночка. Гемодинамічно нестабільна серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда. Не призначають дітям. **Побічні реакції**. Можливі реакції з боку системи крові та лімфатичної системи (агранулоцитоз, пригнічення кісткового мозку, зниження рівнів гемоглобіну і гематокриту, гемолітична анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія), з боку імунної системи (гіперчутливість), з боку метаболізму та живлення (анорексія, гіперкальціємія, гіпергліцемія, гіперліпідемія, гіперурикемія, гіперхлоремічний алкалоз, гіпокаліємія, гіпомагніємія, гіпонатріємія, посилення метаболічних ознак діабету), з боку психіки (депресія, безсоння чи порушення сну, зміни настрою, знічкавість), з боку нервової системи (порушення координації, запаморочення, дисгевзія, екстрапірамідний синдром, головний біль, гіпертонія, летаргія, парестезія, периферична нейропатія, сонливість, синкопе, тремор), а також з боку органів зору та слуху, з боку серця та судинної системи, з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння, з боку ШКТ, печінки та жовчовивідних шляхів, з боку шкіри та підшкірних тканин, скелетно-м'язової системи і сполучної тканини, з боку нирок і сечовидільної системи, репродуктивної системи, молочних залоз та ін. **Умови зберігання**. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. **Категорія відпуску**. За рецептом. **Виробник**. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.
Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкціях для медичного застосування.

Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
Дарниця